

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного препарата
«Йод 5 % спиртовой»

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Йод 5 % спиртовой (Iodi 5 % spirituosa).
- 1.2 В 100 см³ препарата содержится 5 г йода кристаллического, 2 г калия йодистого, 50 см³ спирта этилового и вспомогательные вещества (вода очищенная).
- 1.3 По внешнему виду препарат представляет собой жидкость красно-бурого цвета.
- 1.4 Препарат упаковывают в стеклянные флаконы из темного стекла по 50; 100; 200; 500; 1000 см³. Флаконы с препаратом укупоривают пластмассовыми пробками или крышками.
- 1.5 Препарат хранят с предосторожностью (список Б) в защищенном от света месте при температуре от плюс 4 °С до плюс 25 °С.
- 1.6 Срок годности препарата 3 года с даты изготовления при соблюдении условий хранения и транспортирования.

2 ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Йод обладает антисептическим, противомикробным, фунгицидным и отвлекающим действием. При контакте с кожей и слизистыми йод подавляет ферментные системы микробных клеток, образует с белками клетки бактерий йодамины и коагулирует их, что вызывает гибель микроорганизмов. Йод раздражает рецепторы кожи и слизистых, ускоряет заживление ран, обладает прижигающими свойствами.
- 2.2 При всасывании йод усиливает процессы диссимиляции, участвует в синтезе тироксина, благоприятно действует на липидный и белковый обмен.
- 2.3 Спиртовой раствор йода совмещает в себе бактерицидные и дубящие свойства.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Препарат применяют для антисептической обработки операционного поля, места парентерального введения лекарственных веществ, рук хирурга. В качестве отвлекающего и противовоспалительного средства при заболеваниях кожи.
- 3.2 Препарат наносят на края ран и неповрежденную кожу.
- 3.3 Препарат используют как противовоспалительное и отвлекающее средство при хронических воспалениях суставов, сухожилий и мышц. Для отвлекающего действия раствор наносят на кожу в виде сетки.
- 3.4 Побочных действий при применении препарата не выявлено. Противопоказано применять животным с индивидуальной непереносимостью к компонентам препарата. Не допускается обработка кожи при фурункулезе, крапивнице, трофических язвах, гипертиреозе, почечной недостаточности. Препарат не применяют на раны и слизистые оболочки.
- 3.5 Препарат несовместим с растворами солей железа, ртути, крахмала, дубильными веществами и эфирными маслами.
- 3.6 Убой животных на мясо после применения препарата и использование молока для пищевых целей разрешается без ограничений.

4 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

- 4.1 При работе с препаратом следует соблюдать общепринятые правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные для работы с ветеринарными препаратами.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, пишется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»

211309, д. Должа, ул. Советская д. 26А, Витебский р-н и обл., Республика Беларусь.

Инструкция разработана специалистами ОАО «БелВитунифарм» (Шашкова Ю.А.).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	<i>[Signature]</i>
Секретарь	<i>[Signature]</i>
Эксперт	<i>[Signature]</i>
«10» 01 2020	протокол № 106