

ИНСТРУКЦИЯ **по применению приманки вакциносодержащей антирабической** **«Рабивит-ВБФ»**

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Приманка вакциносодержащая антирабическая «Рабивит-ВБФ».
- 1.2 Вакцина в приманке изготовлена из культурального живого аттенуированного штамма «ERA G333» вируса бешенства, выращенного в культуре клеток ВНК-21, заключенного в капсулы, которые помещены внутрь приманки. Приманка изготовлена из продуктов, съедобных для плотоядных животных (жир говяжий, рыбная мука, парафин). В качестве биомаркера для контроля поедаемости вакцины в состав приманки включен антибиотик тетрациклинового ряда (до 0,175 г/брикет).
- 1.3 По внешнему виду приманка представляет собой брикет в форме цилиндра или параллелепипеда от серого до темно-коричневого цвета массой до 25 г, со специфическим запахом для привлечения плотоядных животных.
- 1.4 Приманки помещают в полиэтиленовые пакеты по 500 штук, которые упаковывают в картонные или деревянные ящики (транспортную тару). Допускается другая упаковка, согласованная с заказчиком.
- 1.5 Хранят и транспортируют приманку при температуре не выше минус 10 °С.
- 1.6 Срок годности приманки – 18 месяцев при соблюдении условий хранения и транспортирования.

2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

- 2.1 Приманка безвредная и ареактогенная для всех видов домашних, сельскохозяйственных и диких животных, а также птиц.
- 2.2 При поедании животными приманки целостность капсулы с вакциной нарушается и содержащийся в ней вирус контактирует со слизистой оболочкой ротовой полости и глотки. Вакцинный вирус попадает в организм, где репродуцируется, инициируя иммунный ответ. Вакцина вызывает выработку специфических антител у диких плотоядных животных против вируса бешенства. Лечебными свойствами вакцина не обладает.
- 2.3 Иммунитет наступает на 21 день после вакцинации и сохраняется в течение 1 года.

3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

- 3.1 Приманку применяют для профилактической вакцинации диких плотоядных животных против бешенства.
- 3.2 Вакцинацию в угрожаемых по бешенству регионах проводят два раза в год:
- первый раз в весенне-летний период при условии отсутствия снега и установлении устойчивой положительной температуры (отсутствие ночных заморозков) при температуре от плюс 4 °С до плюс 25 °С;
 - второй раз с сентября до наступления заморозков при температуре от плюс 4 °С до плюс 25 °С.
- В неблагоприятных по бешенству регионах проводят, дополнительную (третью) вакцинацию в летний период при температуре не выше 25 °С.
- Запрещено проводить вакцинацию при отрицательных температурах!
- 3.3 Приманки размещают по 20-25 штук на 1 км². При раскладке приманок необходимо использовать защитные перчатки, для предотвращения запаха человека на приманках, не курить и не принимать алкоголь, не использовать сильно пахнущие вещества (парфюмерия, дезодоранты и др).
- 3.4 Во время раскладки приманки предохраняют от воздействия температуры выше плюс 15 °С (термоящики, теплонепроницаемые материалы) во избежание разрушения формы приманки и обнажения упаковки с вакциной.

3.5 В местах с установленной высокой плотностью обитания диких плотоядных рекомендуется дополнительное летнее выкладывание приманки на отдельных участках или близко к занятым животными норами в количестве 8-10 брикетов с вакциной на одну нору.

3.6 Приманку необходимо размещать в местах, защищенных от прямых солнечных лучей, а после укладки прикрыть природным материалом (листьями, травой, соломой и т.п.).

3.7 Для обеспечения эпизоотического благополучия региона по бешенству вакцинацию диких плотоядных животных необходимо проводить регулярно на протяжении не менее 6 лет, и не менее 2 лет после последнего случая бешенства.

3.8 Допускается применение приманок с помощью авиационной техники.

3.9 Осложнений после вакцинации у диких плотоядных животных не выявлено.

3.10 Запрещается применять приманку для иммунизации домашних животных.

4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При соблюдении мер личной профилактики приманка не представляет опасности для человека. К раскладке приманки допускается персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.

4.2 В случае попадания вакцины (содержимого капсулы) в глаза, полость рта или носа, а также на поврежденные участки тела человека, необходимо немедленно обратиться к врачу.

4.3 При попадании вакцины на кожу рук или другие открытые участки тела, необходимо тщательно их вымыть с мылом.

4.4 Приманка должна храниться в недоступном месте по списку Б.

5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения препарата, его использование прекращают, и потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.




Ветеринарными специалистами этого учреждения производится изучение соблюдения всех правил по применению препарата в соответствии с инструкцией. При подтверждении выявления отрицательного воздействия препарата на организм животного, ветеринарными специалистами отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, составляется акт отбора проб и направляется в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19А) для подтверждения на соответствие нормативным документам.

6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»

211309, д. Должа, ул. Советская, 26А, Витебская область, Витебский район, Республика Беларусь.

Инструкция разработана специалистами ОАО «БелВитунифарм» (Шашкова Ю.А., Колядко О.С.).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОБРЕНО	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
28.10	2021 г. протокол № 117