

ОДОБРЕНО

Совет по ветеринарным препаратам  
протокол от «24» февраля 2022 г № 119

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению вакцины «БЕЛРАБ» антирабической инактивированной  
из штамма «71 БелНИИЭВ-ВГНКИ»

### 1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Вакцина «БЕЛРАБ» антирабическая инактивированная из штамма «71 БелНИИЭВ-ВГНКИ» (*BELRAB*).

1.2 Вакцина изготавливается из штамма вируса бешенства «71 БелНИИЭВ-ВГНКИ», инактивированного теотропином или формалином с добавлением в качестве адьюванта гидроокиси алюминия. Вирус культивируется в культуре клеток почки сирийского хомяка (ВНК-21) или почки зеленой мартышки (*Vero*)).

1.3 Лекарственная форма: суспензия для инъекций. Вакцина по внешнему виду представляет собой жидкость с рыхлым осадком без посторонних примесей, которая при встряхивании образует гомогенную суспензию и приобретает цвет от бежевого до белого-розового с различными оттенками.

1.4 Вакцину выпускают упакованной в стерильные стеклянные флаконы номинальным объемом по 1,0; 2,0; 8,0; 10,0; 20,0; 50,0; 100,0 и 200,0 см<sup>3</sup>. Каждый флакон с вакциной должен быть закрыт резиновой пробкой и обкатан алюминиевым колпачком.

1.5 Вакцину хранят при температуре от плюс 2 °С до плюс 8 °С в сухом, защищенном от света месте. Срок годности 18 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий транспортирования и хранения вакцины. После вскрытия флакона вакцину используют в течение 8 часов.

### 2 БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

2.1 Вакцина вызывает у животных выработку специфических антител и обеспечивает иммунную защиту против бешенства.

2.2 Иммунитет у вакцинированных животных наступает через 10-14 суток после вакцинации, достигает максимальной напряженности через 3-4 недели, сохраняется не менее 12 месяцев.

2.3 Вакцина безвредна, лечебными свойствами не обладает. Одна минимальная иммунизирующая доза вакцины имеет иммуногенную активность не менее 1,0 МЕ.

### 3 ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

3.1 Вакцина предназначена для иммунизации домашних и сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей, верблюдов, свиней, собак и кошек) против бешенства в угрожаемых и неблагополучных по этой болезни хозяйствах и местностях.

3.2 Вакцинации подлежат клинически здоровые сельскохозяйственные животные с трехмесячного возраста, собаки и кошки - с двухмесячного возраста.

3.3 Для профилактической иммунизации животных, прививаемых против бешенства впервые, вакцину вводят двукратно с интервалом 20-30 суток. Животным, ранее прививавшимся против бешенства, вакцину вводят однократно. Ревакцинацию проводят через год.

3.4 Вакцину вводят подкожно в области шеи или внутримышечно в области бедра. Перед применением вакцину встряхивают до образования однородной взвеси.

3.5 Вакцину вводят в объеме (на одну инъекцию):

- щенкам двухмесячного возраста и старше и взрослым собакам мелких декоративных пород (болонки, таксы, шпицы, терьеры и др.), а также кошкам – 1,0 см<sup>3</sup>;
- собакам крупных пород (овчарки, сенбернары и др.) массой свыше 10 кг – 1,5 см<sup>3</sup>;
- мелкому рогатому скоту и свиньям – 1,5 см<sup>3</sup>;
- крупному рогатому скоту, лошадям, верблюдам и другим крупным животным – 3,0 см<sup>3</sup>.

3.6 Вынужденную вакцинацию проводят не позднее 72 ч после возможного инфицирования животного. Вакцину вводят животным четырехкратно в вышеуказанных дозах три дня подряд с отдаленной инъекцией через 16 суток от начала иммунизации.

Животным с клиническими признаками или подозрительным по заболеванию бешенством, вводить вакцину запрещается. За иммунизированными животными устанавливают наблюдение в течение одного месяца.

3.7 Вакцинацию проводят с соблюдением правил асептики и антисептики. Место инъекции обрабатывают спиртом с объемной долей 70 % или другим дезинфектантом для наружного применения в ветеринарии. Шприцы и иглы стерилизуют кипячением или используют одноразовые.

3.8 Вакцина безопасна для беременных животных.

3.9 После применения вакцины иногда возможны реакции гиперчувствительности. В этом случае показано подкожное введение адреналина.

3.10 О проведенной вакцинации животных составляют акт с указанием даты вакцинации, эпизоотического состояния хозяйства (местности), количества привитых животных, номеров серии и контроля вакцины, наименования изготовителя, фамилий и инициалов лиц, проводивших вакцинацию. Вскрытые, но не использованные в течение 8 ч флаконы с вакциной обеззараживают путем кипячения в течение 15 мин.

3.11 Молоко и продукты убоя от иммунизированных сельскохозяйственных животных используют без ограничений.

#### 4 МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

4.1 При проведении вакцинации животных следует соблюдать меры личной гигиены, предъявляемые к работе с биологическими препаратами.

4.2 При попадании вакцины на кожу или конъюнктиву, необходимо обильно промыть их теплой водой. После работы тщательно вымыть руки, открытые участки кожи водой с мылом.

#### 5 ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ РЕКЛАМАЦИЙ

5.1 В случае возникновения осложнений после применения вакцины, ее использование прекращают, потребитель обращается в Государственное ветеринарное учреждение, на территории которого он находится.

Ветеринарными специалистами этого учреждения производится проверка соблюдения правил инструкции по применению вакцины, а также условий хранения и транспортировки.




В случае выявления отрицательного воздействия вакцины на организм животного ветеринарными специалистами комиссионно отбираются пробы в необходимом количестве для проведения лабораторных испытаний, которые направляются вместе с актом отбора проб в Государственное учреждение «Белорусский государственный ветеринарный центр» (220005, г. Минск, ул. Красная, 19а) для подтверждения на соответствие нормативных документов.

#### 6 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 ОАО «БелВитунифарм»

211309, д. Должа, ул. Советская, д. 26А, Витебский район, Витебская область, Республика Беларусь.

Инструкция по применению вакцины разработана сотрудниками РУП «Институт экспериментальной ветеринарии им. С.Н. Вышелесского» (Н.А.Ковалев, Д.В.Бучукури, М.М.Усеня).

Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь	
Совет по ветеринарным препаратам	
ОДОУ ВЕТ	
Председатель	
Секретарь	
Эксперт	
24 ФЕВ 2022	