

ИНСТРУКЦИЯ
по применению ветеринарного лекарственного препарата
«Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота»

1. Торговое наименование.

Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота.

2. Общепринятое (группировочное) наименование:

Вакцина живая сухая против трихофитии крупного рогатого скота.

3. Регистрационный номер.

7137-10-20 БВБЖС.

4. Лекарственная форма.

Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения.

Описание. Однородная сухая масса в виде таблетки от светло-серого до бежевого цвета.

5. Состав.

Вакцина представляет собой лиофильно высушенный живой аттенуированный штамм гриба *Trichophyton verrucosum* (ТФ-130 Л, ВГНКИ), выращенный на твердой питательной среде.

Для растворения вакцины используют стерильный изотонический раствор натрия хлорида (растворитель).

6. Фармакотерапевтическая группа.

Вакцины, сыворотки, фаги и анатоксины в комбинациях.

7. Описание иммунологических (иммунобиологических) свойств ветеринарного лекарственного препарата.

Вакцина обладает профилактическими и лечебными свойствами. Вакцина в своем составе содержит микроконидии живого вакцинного штамма *Trichophyton verrucosum*, которые вызывают выработку специфических антител, обеспечивающих иммунитет против трихофитии.

В 1 дозе вакцины содержится от 20 до 60 млн. жизнеспособных микроконидий гриба. Вакцина безвредная и ареактогенная. Иммунитет у привитых животных наступает через 30 суток после повторного введения вакцины и сохраняется не менее 7 лет.

8. Показания для применения.

Вакцину применяют для профилактики и лечения крупного рогатого скота при трихофитии.

9. Противопоказания.

Вакцинации не подлежат животные с повышенной температурой тела, с признаками истощения или каких-либо заболеваний.

10. Способ применения и дозы.

Перед применением вакцину растворяют. Для этого стерильным шприцем с соблюдением правил асептики во флакон с вакциной вносят 5 см³ стерильного растворителя (натрия хлорид изотонический) и встряхивают до получения равномерной взвеси. Полученную взвесь шприцем переносят в стерильный флакон и добавляют стерильный растворитель из расчета 1 см³ растворителя на одну дозу вакцины. Растворенная указанным способом вакцина готова к применению.

Пример: во флакон, содержащий 20 доз вакцины, вносят 5 см³ стерильного растворителя, встряхивают до получения равномерной взвеси. Полученную взвесь шприцем переносят в стерильный флакон и добавляют 15 см³ стерильного растворителя.

Вакцину вводят внутримышечно в область крупа. Волосной покров на месте инъекции предварительно выстригают и обрабатывают антисептическим средством, разрешенным к применению. Шприц и иглы перед использованием стерилизуют кипячением.

С профилактической целью вакцину применяют двукратно с интервалом 10-14 суток в следующих дозах:

- телятам от 14 суток до 4 месяцев – 1 см³;
- телятам старше 4 месяцев и взрослым животным – 2 см³.

С лечебной целью вакцину вводят больным животным двукратно с интервалом 10-14 суток в следующих дозах:

- телятам в возрасте до 4 месяцев – 2 см³;
- телятам старше 4 месяцев и взрослым животным – 4 см³.

Телят, начиная с возраста 14 суток, в благополучных и неблагополучных по трихофитии хозяйствах подвергают обязательной профилактической иммунизации.

Необходимо вести наблюдение за состоянием привитых животных в течение 30 суток после вакцинации. Нормальной реакцией на введенную вакцину является образование на месте ее инъекции локализованной поверхностной корочки диаметром до 20 мм, которая через 20-25 суток самопроизвольно отторгается и не требует обработки лечебными средствами.

Лечебный эффект проявляется через 20-30 суток после второго введения вакцины и выражается в утончении и отторжении трихофитийных корочек. Для ускорения отторжения трихофитийных корочек пораженные участки рекомендуется обрабатывать размягчающими средствами - рыбьим жиром, вазелином и т.д.

11. Меры предосторожности при применении.

Следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с ветеринарными лекарственными препаратами. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, немедленно промыть их большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению лекарственного препарата или этикетку).

Пустые флаконы из-под ветеринарного лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

12. Передозировка.

Симптомы передозировки у животных не установлены.

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

13. Беременность и период лактации.

С осторожностью вакцинируют животных в первой половине беременности в случае заболевания или угрозы заражения. Запрещено вакцинировать животных во второй половине беременности.

14. Особые указания.

Вакцинации не подлежат животные с повышенной температурой тела, с признаками истощения, а также в последние сроки стельности. Не допускается применение вакцины в хозяйствах, неблагополучных по остроинфекционным заболеваниям до ликвидации этих заболеваний.

Перегруппировка, транспортировка вакцинированных животных разрешается без ограничений через месяц после последнего введения вакцины.

15. Побочное действие и индивидуальная непереносимость.

Введение вакцины животным, находящимся в инкубационном периоде заболевания, ускоряет клиническое проявление трихофитии. Таким животным необходимо ввести дополнительно однократно лечебную дозу вакцины.

16. Взаимодействие с другими ветеринарными лекарственными препаратами.

Запрещается применение вакцины совместно с другими живыми иммунобиологическими препаратами.

17. Форма выпуска.

Вакцину упаковывают в стерильные стеклянные флаконы вместимостью 10 см³ по 5; 10; 15; 20; 25; 30; 35 и 40 доз, укупоривают резиновыми пробками и обкатывают металлическими колпачками.

18. Срок годности.

Срок годности - 18 месяцев от даты выпуска при соблюдении условий хранения и транспортирования. Запрещено применение вакцины по истечении срока годности.

19. Условия хранения.

Хранят в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 2 °С до 10 °С. Вакцину следует хранить в недоступном для детей месте. После растворения вакцину используют в течение 8 часов, неиспользованные остатки уничтожают кипячением в течение 30 минут.

20. Условия отпуска.

Отпускается без рецепта ветеринарного врача.

21. Условия уничтожения.

Вакцину уничтожают в соответствии с требованиями законодательства.

22. Сроки возможного получения пищевого сырья животного происхождения после применения ветеринарного иммунобиологического лекарственного препарата продуктивным животным.

Молоко от вакцинированных животных используют без ограничений. Мясо животных при вынужденном убое используется без ограничений при иссечении мышц в месте введения вакцин.

23. Правообладатель ветеринарного лекарственного препарата и адрес места осуществления деятельности, номер телефона и электронной почты:

Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 211309, Витебская область, Витебский район, с/с Мазоловский, д. Должа, ул. Советская, д. 26А, тел. +375212295155, e-mail: info@belvitunifarm.by.

24. Производитель ветеринарного лекарственного средства.

Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Государственное учреждение
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР»

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 211309, Витебская область, Витебский район, с/с Мазоловский, д. Должа, ул. Советская, д. 26А, тел. +375212295155, e-mail: info@belvitunifarm.by.

25. Организация, уполномоченная на принятие претензий.

Открытое акционерное общество «БелВитунифарм»

Юридический и фактический адрес: Республика Беларусь, 211309, Витебская область, Витебский район, с/с Мазоловский, д. Должа, ул. Советская, д. 26А, тел. +375212295155, e-mail: info@belvitunifarm.by.

СОГЛАСОВАНО

«Белорусский государственный
ветеринарный центр»

(Приказ Департамента ветеринарного
и продовольственного надзора)

№ 8 от 19.02.2026